



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ФОРМИРОВАНИЕ ПАЛЕОФЛОР И МЕЛОВОЙ ВУЛКАНИЗМ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АЗИИ

С.В. Щепетов, А.Б. Герман, В.Ю. Нешатаева






СЕВЕРО-ВОСТОК АЗИИ



Типовые тафофлоры ископаемых флор (а) и близкие к ним по составу комплексы растений (б):

		рариткинской		горнореченской		барыковской		пенжинской и кавьяямской
		гребенкинской		раннегинтеровской, буор-кемюсской и сияльпской		ольской и аркагаалинской		чаунской
		аликской		амгуэмской (+ энмываамский комплекс)		ульинской		ожогинской
								пеженской






Типовые тафофлоры ископаемых флор (а) и близкие к ним по составу комплексы растений (б):

	рарыттинской		горнореченской		барыковской		пенжинской и кайваямской
	гребенкинской		раннегинтеровской, буор-кемюсской и сияпской		ольской и аркагаалинской		чаунской
	аликской		амгуэмской (+ энмываамский комплекс)		ульинской		ожегинской
							пеженской









**УЦЕЛЕВШИЙ ОСТРОВOK ЗЕЛЕНИ –
ОТСЮДА НАЧНЕТСЯ ЗАСЕЛЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.**


9









MYGDYKITIA OCHOTICA GOLOVN. ET SHCZER.




ПЕГТЫМЬСКОГО ПРОГИБА



ИЗОЛЯЦИЯ НА ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЯХ КАЙНОФИТНОЙ ФЛОРЫ В АЛЬБЕ-ТУРОНЕ





**РЫХЛАЯ ТЕФРА, НА
КОТОРОЙ ВЫРОС
КОЛОКОЛЬЧИК
ВОЛОСИСТОПЛОДНЫЙ**

