МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР

ЛЬВОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени ИВАНА ФРАНКО

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

№ 21

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ
НАУЧНЫЙ СБОРНИК**

Издается с 1961 года

Библиотека академика А. Л. Яншина

ЛЬВОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЬВОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВИЩА ШКОЛА»
1984

Фиг. *13. Sethocyrtis?* sp. Экз. № 60/1′ шлиф, продольное сечение, слой 15, обр. 60.

Фиг. *14. Phormocyrtis striata* Brandt. Экз. № 60/15, шлиф, продольное сечение, слой 15, обр. 60.

R. X. LIPMAN

NEW EARLY EOCENE SPECIES *SETHODISCUS VIALOVI* IN COMPLEX OF RADIOLARIA OF ABAZINSKAYA SUIT OF NORTH-WEST FOR-CAUCASUS

Summary

Deviding of Lower Paleogene section is given here, in which according to radiolaria, six layers with their index-species are singled out. *Sethodiscus vialovi* described for the first time is a typical species for the top of Lower Eocene part of abazinskaya suit.

Статья поступила в редколлегию 18.01.83

УДК 564.121

О. С. ВЯЛОВ, акад. АН УССР
(Львов. ИГГГИ АН УССР)

КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРИЦ

Автор [1, 2, 4] сделал первую попытку систематизировать все существующие материалы и выделить основные группы в семействе *Ostreidae* Rafinesque, установленном еще в 1815 г. (fam. *Ostreacia* Rafinesque). Было выделено четыре подсемейства—*Ostreinae, Gryphaeinae, Lophinae* и *Exogyrinae* [1]. Основным признаком считалось строение верхней створки, остающееся постоянным при всех изменениях нижней створки, нередко искаженной прирастанием. Со времени опубликования первой схемы классификации в 1936 г. никаких существенных изменений в систематике устриц не происходило. Лишь вводились, не всегда обоснованно, отдельные новые таксоны. Деление на четыре подсемейства получило у нас общее признание.

В 1971 г. Г. Стенцель [3] опубликовал большой труд, посвященный устрицам. Он включил в свою классификацию большую часть таксонов нашей схемы, восстановил некоторые отвергавшиеся старые и ввел несколько новых. Однако он перегруппировал их, изменил соподчинение, перенес из одного подсемейства в другое.

В основу классификации Г. Стенцеля положены признаки, которые не кажутся нам очень существенными. Частью же они вообще не могут наблюдаться на ископаемых формах. Значение формы мускульного отпечатка и кренелюры, как и везикулярной структуры, доведено до крайности. Г. Стенцель ввел значительную путаницу в классификацию устриц. В его классификации получилась искусственная смесь совершенно разнородных форм. Нам хотелось бы предостеречь всех, кто занимается, а особенно тех, кто начинает изучать устриц, от безоговорочного пользования классификацией Г. Стенцеля.

Зоологи, занимающиеся современными моллюсками, стали строить классификацию на анатомических и физиологических признаках, и прежде всего на способе размножения. Они делят устриц на яйцекладущих и яйцеживородящих. Поскольку основная масса устриц находится только в ископаемом состоянии, а ныне живущих видов совсем немного, мы все же считаем, что классификация должна разрабатываться с учетом возможности ее применения прежде всего к ископаемым.

Прошло почти 50 лет с момента опубликования предложенной нами схемы. За время ее «жизни» появилось много новых данных, установлено небольшое количество новых таксонов. Сейчас имеется общая

тенденция к повышению всех рангов, к введению все большего количества таксонов родовой группы, к дроблению старых родов. Устрицы рассматриваются уже как надсемейство, и даже подотряд *Ostreina*. Следующими по нисходящей иерархии являются выделенные нами четыре подсемейства. Естественно теперь поднять их до уровня семейства. Так уже и делается, но с разным соподчинением и в различных комбинациях. Ранг всех четырех бывших подсемейств должен быть одинаковым и мы рассматриваем их теперь как семейства. В каждом из них, кроме лофид, следует выделить два подсемейства — гладких и ребристых форм. Уже Г. Стенцель перевел некоторые наши секции и подроды в самостоятельные роды. Мы принимаем это изменение. Мы попытались проанализировать новые данные и пересмотрели свою первоначальную схему. Основные изменения в ней — перевод четырех подсемейств в семейства и выделение в последних новых подсемейств. Кроме того, включено некоторое количество дополнительных родов [5].

Подотряд *Ostreina* Ferrusac, 1822
Надсемейство *Ostreacea* Rafinesque, 1815
Семейство *Ostreidae* Rafinesque, 1815

Обе створки выпуклые: нижняя створка гладкая или ребристая, верхняя гладкая.

Подсемейство *Ostreinae* Rafinesque, 1815

Нижняя створка несет радиальную скульптуру.

Род *Ostrea* L., 1758; тип: *O. edulis* L.

Скульптура состоит из пологих волн, сравнительно немногочисленных. Раковина несимметричная, с оттянутым задним краем.

Подрод *Bellostrea* Vialov, 1936; тип: *O. bellovacina* Lam. Раковина большая, широкая, округленная, приближается к симметричной, радиальные волны многочисленные, хорошо выраженные, по крайней мере, вблизи макушки.

Род *Cymbulostrea* Sacco, 1897; тип: *O. cymbula* Lam. Скульптура состоит из однородных радиальных ребер. Макушка развитая, в большей или меньшей степени заостренная, раковина высокая.

Род *Cubitostrea* Sacco, 1897; тип: *O. cubitus* Desh. Раковина резко несимметричная, удлиненная, сильно загнутая назад. Скульптура состоит из неоднородных ребер, длинных, радиально расходящихся в передней и центральной частях раковины, и коротких, параллельных, сближенных в задней части.

Род *Saccostrea* Dollfus et Dautzenberg, 1920; тип: *O. saccellus* Dujardin. Раковина вытянутая в высоту, иногда очень сильно, общая форма бывает даже рудистообразной, лигаментная площадка чрезвычайно высокая, в отдельных случаях превышает высоту остальной части раковины; макушка удлиненная, суженная; глубокая умбональная полость. Скульптура состоит из хорошо выраженных широких округленных, неправильных, сравнительно немногочисленных ребер.

Род *Pulvinostrea* Vialov, 1936; тип: *O. fluctuosa M.-E* (Oppenheim) 1903 (табл. I, фиг. 12). Макушка заостренная, раковина высокая, скульптура состоит из нескольких широко расставленных прерывистых чешуйчатых ребер.

Род *Striostrea* Vialov, 1936; тип: *O. procellosa* Valenc. Скульптура состоит из очень тонких струек. Раковина округленная или овальная.

Род *Platygena* Romanovsky, 1882; тип: Pl. *asiatica* Rom. Обе створки почти одинаковы и лишь очень слабовыпуклые. Скульптура нижней створки состоит из многочисленных пологих радиальных ребер.

Род *Turkostrea* Vialov, 1936; тип: *O. turkestanensis* Rom. Раковина овальная или треугольно-овальная, сильновыпуклая. Макушка

сильно развитая, в большей или меньшей степени грифовидно загнутая. Радиальная скульптура в виде сближенных ребер округлого сечения.

Подрод *Gorizdrella* Vialov, 1936; тип: *O. gorizdroae* Vial. Раковина маленькая, округленная, низкая, приближающаяся к симметричной. Ребра сближенные, такого же типа, как у *Turkostrea*.

Род *Flemingostrea* Vredenburg, 1916; тип: *O. flemingi* Arch. et Haime. Тонкая, лучистая, иногда прерывистая скульптура; верхняя створка несет очень характерную концентрическую скульптуру в виде отчетливых колец; иногда наблюдаются тонкие радиальные струйки. Раковина приближается к равностворчатой и равносторонней. Смычной край створок ровный, не волнистый. Теребратулоидный синус у типового вида отсутствует.

Следующие три рода по характеру своей скульптуры находятся на грани *Ostrea* и *Liostrea*, так как обладают слабой неправильной волнистостью, часто едва заметной или даже совершенно исчезающей в пределах одного и того же вида. Для выделения их, кроме этих особенностей скульптуры, послужил характер раковины (форма и т. д.).

Род *Crassostrea* Sacco, 1897; тип: *O. virginica* Gmel. Раковина у ископаемых форм толстая, массивная, у современных — более тонкая, чрезвычайно высокая, с сильно вытянутой макушечной частью: обе створки примерно одинаково и очень слабовыпуклые; нижняя створка то гладкая, то несет слабозаметные, неправильные, радиальные волны, развитые спорадически. У современных форм, причисляемых к этому роду, скульптура бывает и достаточно резко выраженной.

Род *Solidostrea* Vialov, 1948; тип: *O. hemiglobosa* Rom. Раковина толстая, массивная, овально-округлая, весьма широкая. Нижняя створка то гладкая, то несет слабозаметные, неправильные радиальные волны, развитые спорадически, лучше всего в примакушечной части.

Род *Angustostrea* Vialov, 1936; тип: *O. angusta* Desh. Раковина тонкая, весьма высокая, узкая, с сильно вытянутой суженной и заостренной макушкой. Нижняя створка то гладкая, то несет слабо заметные, неправильные радиальные ребра, развитые спорадически.

Подсемейство *Liostreinae* Vialov, 1983.

Нижняя створка лишена радиальной скульптуры.

Род *Liostrea* Douvillé, 1904; тип: *O. lamellosa* Dunker. Макушка слабо выступающая, раковина овальная.

Род *Acutostrea* Vialov, 1936; тип: *O. acutirostris* Nilss. Примакушечная часть раковины сильно суженная, макушка заостренная, нижняя створка заметно более выпуклая, чем верхняя.

Род *Ostreonella* Romanovsky, 1890; тип: *O. prima* Rom. Обе створки чрезвычайно сильно и почти одинаково вздутые.

Род *Quadrostrea* Vialov, 1936; тип: *O. tetragona* Bayle. Макушка слабо выступающая, замочный край прямой, раковина угловатая.

Род *Curvostrea* Vialov, 1936; тип: *O. rediviva* Coq. Раковина удлиненная, узкая, сильно загнутая назад, обе створки умеренно выпуклые.

Род *Deltoideum* Rollier, 1917; тип: *O. sowerbyana* Bronn (=*O. deltoideum* Sow. non Lamarck). Обе створки одинаково и очень слабовыпуклые, треугольные или округленные.

Род *Anulostrea* Vialov, 1936; тип: *O. bourguignati* Coq. Верхняя створка несет очень харктерную концентрическую скульптуру в виде отчетливых колец.

Род *Labrostrea* Vialov, 1945; тип: *O. labrum* Vialov. Миниатюрная несимметричная раковинка с оттянутым задним краем. На внутренней поверхности нижней створки обособляются центральная резко углубленная часть и боковые плоские поля.

Род *Kokanostrea* Vialov, 1936; тип: *O. kokanensis* Sok. Макуш-

ка сильно развитая, грифоидная, загнутая не назад, а вперед (прозогирная), замочная площадка наклонена вперед; задний скат раковины круче переднего.

Триба *Odontogryphaeini* Vialov, 1983.

В нижней части раковины наблюдаются горбообразное вздутие на нижней створке и соответствующий ему синус верхней.

Род *Odontogryphaea* Ihering, 1903; тип: *Gr. consors var. rostrigera* Ihering, (=*Sinustrea* Vialov, 1936; тип: *O. morgani* Vredenb.). Раковина высокая, треугольно-овальная с развитой макушкой, с теребратулоидной складкой в нижней части.

Подсемейство *Costeiniinae*, 1983.

Нижняя створка несет радиальную скульптуру.

Род *Fatina* Vialov, 1936; тип: *Gryphaea beldersaiensis* Gorizdro, 1915. Скульптура состоит из округленных в сечении ребер, покрывающих большую или меньшую часть поверхности раковины, то более, то менее резко выраженных.

Подрод *Fatina* Vialov, 1936. Ребра покрывают всю или значительную часть поверхности раковины.

Подрод *Sokolowia* Böhm, 1933; тип: *Gryphaea estarházyi* Pávay. Ребра развиты только у макушки.

Род *Costeina* Vialov, 1965 (=*Avia* Vialov, 1936, non Navas, 1912); тип: *Ostrea costei* Coquand. Скульптура состоит из неоднородных неправильных морщинок, то покрывающих всю поверхность, то появляющихся спорадически.

Род *Vultogryphaea* Vialov, 1936, тип: *Ostrea vultur* Coquand. Скульптура состоит из нескольких резких килеподобных складок, иногда прерывистых, шиповатых, разделенных широкими гладкими промежутками.

Род *Africogryphaea* Freneix, 1965; тип: *Liogryphaea costellata* Douvillé. Вытянутые в высоту раковины с немногочисленными неправильными ребрами, то сильно выступающими, то разглаживающимися.

Род *Catinula* Rollier, 1911; тип: *Ostrea knorri* Voltz. Миниатюрные раковины с хорошо развитой радиальной скульптурой в виде иногда раздваивающихся ребер, то сближенных, то расходящихся, неоднородных.

Семейство *Lophidae* Vialov, 1936

Обе створки обладают радиальной скульптурой, смычной край обеих створок складчатый или волнистый.

Подсемейство *Lophinae* Vialov, 1936

Раковина широкая, прямая или очень слабо изогнутая, ребра расходятся от макушки.

Род *Lopha* (Bolten) Röding, 1798; тип: *Mytilus cristagalli L.* (=*Hyotissa* Stenzel, 1971, тип: *Mytilus hyotis* L.). Скульптура в виде немногочисленных, резких, очень глубоких, довольно острых складок. Раковина равностворчатая, общие очертания округленные.

Род *Alectryonella* Sacco, 1897; тип: *Ostrea plicata* Gmelin. Довольно резкие, но не острые, округленные в сечении складки со столь же широкими и округленными промежутками. Общие очертания ближе к округленным, правая створка уплощенная.

Род *Actinostreon* (Bayle, 1878) Douvillé, 1879; тип: *Ostrea solitaria J.* Sowerby. Ребра многочисленные, сближенные, но не узкие, в сечении не угловатые. Раковины овальные или овально-округленные, с оттянутым нижнезадним краем.

Род *Abruptolopha* Vialov, 1936; тип: *Ostrea abrupta* d'Orbigny. Ребра однотипные, узкие, угловатые, весьма многочисленные, почти не дихотомирующие. Раковина прямая, грушевидная.

УДК 562/569.121

О.С.Вялов

Дополнение к классификации устриц (Палеонт. Сб. № 22)

В предыдущей статье автора было несколько досадных пропусков, которые мы здесь восполняем. Пропущено семейство Gryphaeidae и его подсемейство Gryphaeinae, которые должны идти перед описанием подсемейства Costeininae Vialov, принадлежащего семейству Gryphaeidae.

В семействе Exogyridae пропущен род Nanogyra Beurlen, который должен идти перед родом Exogyra Say и род Gyrostrea Mirkamalov (сразу после рода Costagyra Vialov). В самом конце перечня таксонов этого же семейства должна быть добавлена характеристика рода Neogyra Vialov.

Восстановим пропущенную часть семейства Gryphaeidae.

Семейство Gryphaeidae Vialov, 1936.

Нижняя створка в большей или меньшей степени выпуклая, гладкая или ребристая; верхняя створка плоская или вогнутая.

Подсемейство Gryphaeinae Vialov, 1936.

Нижняя створка гладкая.

Род Gryphaea Lam., 1801; тип: Gr. arcuata Lam. Макушка развитая в большей или меньшей степени, загнутая внутрь или прямая.

Подрод Gryphaea s. str. Макушка обособленная, сильно развитая, грифовидно загнутая внутрь.

Подрод Rygepha Vialov, 1946; тип: Gr. skuld Böhm. Макушка необособленная, не завернутая, занимает близкое к среднему положение; раковина сравнительно слабо выпуклая, суженная, высокая.

Подрод Phygraea Vialov, 1936; тип: Gr. frauscheri Vialov. 1936; (=Gr. escheri Frauscher, 1886 non M.-E., 1876). Макушка слабо выступающая, раковина широкая, низкая, несимметричная, с оттянутым задним краем.

Род Pycnodonte Fischer de Waldheim, 1835; тип: P. radiata Fischer de Wald. По автору рода раковина имеет субквадратное очертание с ушковидными отростками, замочный край почти прямой, по обеим сторонам замочной площадки располагаются многочисленные складочки - (морщинки). Стенцель прибавил ещё везикулярную структуру раковины.

Подрод Biauris Cossmann, 1922; тип: Gr. subhippopodium d'Arch. Маленькие раковинки с необособленной макушкой, с двумя ушками; замочный край прямой.

Род Gigantostrea Sacco, 1897; тип: O. gigantica Sol. Раковина толстая, массивная, овально округлая, весьма широкая; нижняя створка то гладкая, то несёт слабые неправильные радиальные волны, развитые спорадически.

Род Ferganea Vialov, 1936; тип: Gr. sewerzowi Rom. Макушка обособленная, сильно развитая, грифовидная, но загнутая вперед (прозогирная); замочная площадка наклонена вперед; задний скат раковины круче переднего.

Род Praeexogyra Chales et Maubeuge, 1952; тип: O. acuminata Sow. Маленькие узкие, серповидно-изогнутые раковины со слабо выпуклой нижней и плоской или слабо-вогнутой верхней створкой. Отмечаются иногда очень тонкие радиальные нити. Отсутствуют признаки, которые могли бы свидетельствовать о переходном положении к экзогирам.

Род *Nicaisolopha* Vialov, 1936; тип *Ostrea nicasi* Coquand. Скульптура в виде редких правильных радиальных волн. Раковина прямая, вытянутая в высоту, треугольно-овальная.

Подрод *Beylopha* Vialov, 1983; тип: *Ostrea clot-beyi* Bellardi. Несколько неправильных, неупорядоченных пологих складок. Раковины маленькие, лишенные сколько-нибудь определенной формы или неправильно-овальные.

Род *Ostreola* Monterosato, 1884; тип: *Ostrea stentina* Peyraudeau. На обеих створках скульптура развита неодинаково; на верхней створке имеются лишь пологие волны, соответствующие ребрам нижней створки. Раковина овальная, вытянута в высоту, иногда суживающаяся в макушечной части, макушка бывает развитая.

Подсемейство *Arctostreinae*, 1983.

Раковина узкая, сильно изогнутая. Ребра расходятся от срединной линии или от срединного гладкого поля.

Род *Arctostrea* Pervinquière, 1910; тип: *Lopha carinata* Lamarck. Ребра весьма многочисленные, узкие, короткие, расходятся от срединной линии. Смычной край резко складчатый, с остроугольными складками. Раковина узкая, еще более суживающаяся к вентральному краю.

Подрод *Falcostrea* Vialov, 1983; тип: *Ostrea falcata* Morton. Занимает промежуточное положение между лофинами, *Arctostrea* и *Agerostrea*. Иногда появляется небольшое гладкое поле; ребра расходятся от макушки или от конца гладкого поля. Раковина резко изогнутая, как у арктострей. Ребра сравнительно немногочисленные, очень сильно расширяющиеся к смычному краю. Н. Н. Бобкова в 1961 г. первая писала о возможности при дальнейшем изучении выделения *Arcostrea falcata* Morton и близких к ней видов в особый подрод.

Род *Rastellum Farjas—Saint-Fond*, 1799 (? 1802); тип: *Ostrea macroptera* Sowerby. Диагноз, по Г. Стенцелю [3, с. 1165]: Очертания раковины с бо́льшей тенденцией к треугольному увеличению (crescentic), чем к увеличению с параллельными краями. Складки обычно без хиотных шипов.

Род *Agerostrea* Vialov, 1936; тип: *Ostracites ungulatus* Schlotheim. Ребра весьма многочисленные, узкие, очень короткие, расходятся от срединного гладкого поля. Смычной край резко складчатый с остроугольными или слегка округленными складками.

Семейство *Exogyridae* Vialov, 1936

Макушки обеих створок спирально-изогнутые назад. Также изгибается и замочная площадка. Кончик макушки верхней створки не выходит за пределы створки и повернут вниз, вперед или даже вверх.

Разделение семейства основано прежде всего на отсутствии радиальной скульптуры или на ее развитии только на нижней створке либо же на обеих створках. Кроме того, предлагалось в особое подсемейство объединить самые древние юрские формы, замок которых еще не вполне экзогироидный и не потерявший остренидного характера. Еще одно надродовое подразделение предлагалось для форм с лигаментной ямкой экзогироидно-завернутой в молодую стадию роста, но затем выпрямляющейся.

Подсемейство *Exogyrinae* Vialov, 1936

Нижняя створка ребристая, верхняя гладкая или несет едва заметные признаки волнистости.

Род *Exogyra* Say, 1819; тип: *Exogyra costata* Say.

Подрод *Exogyra s.* str. Радиальная скульптура состоит из многочисленных отчетливо выраженных правильных ребер; верхняя створка несет едва заметные признаки волнистости, концентрические слои нара-

стания на ней весьма отчетливые. Задняя часть створок несколько оттянутая, выступающая. Очертания верхней створки преимущественно овальные, вытянутые в переднезаднем направлении.

Подрод *Ilymatogýra* Stenzel, 1971; тип: *Exógyra arietina* Roemer, 1852. Был выделен (как род) на основании строения макушечной части левой створки, завернутой в виде штопора, мы бы еще добавили очень длинной, хоботовидной.

Подрод *Fluctogyra* Vialov, 1936; тип: *Exogyra trigeri* Coquand, 1869. Радиальная скульптура состоит из пологих волн, иногда развитых спорадически, не на всей поверхности створки. Очертания верхней створки преимущественно овальные, вытянутые в переднезаднем направлении. Задняя часть створок сильно оттянутая, резко выступающая.

Подрод *Nutogyra* Vialov, 1936; тип: *Ex. fourneti* Coquand, 1869. Нижняя створка несет только легкую радиальную зыбь, иногда в примакушечной части. Это крайняя степень ослабления скульптуры.

Род *Costagyra* Vialov, 1936; тип: *Exagyra olisiponensis* Scharpe, 1850. Радиальная скульптура состоит из редких резких ребер, иногда прерывистых и чешуйчатых.

Подсемейство *Ceratostreoninae* Vialov, 1983.

Обе створки обладают радиальной скульптурой.

Род *Ceratostreon* Bayle, 1878; тип: *Exogyra flabellata* Goldfuss. Обе створки обладают радиальной скульптурой.

Подсемейство *Amphidonteinae* Vialov, 1983.

Обе створки лишены радиальной скульптуры. Левая створка гладкая или снабжена килем.

Род *Amphidonte* Fischer de Waldheim, 1829; тип: *Amphidonte humboldti* Fischer de Waldheim. Нижняя створка гладкая, лишена киля.

Род *Aetostreon* Bayle, 1878; тип: *Gryphaea latissima* Lamarck, 1819. Нижняя створка снабжена килем; иногда несет легкие неправильные волны.

Род *Gryphaeostrea* Conrad, 1865; тип: *Gryphaea eversa* Melleville, 1843. Нижняя створка гладкая с сильно развитым верхнезадним крылом, с глубокой внутренней полостью. Скульптура верхней створки состоит из резких концентрических колец (складок). Замочная площадка спирально завернута только в начале взрослой жизни моллюска, а затем становится более или менее прямой.

Список литературы: 1. *Вялов О. С.* О классификации устриц. — ДАН СССР, 1936, т. 13, № 1, с. 19—22. 2. *Вялов О. С.* Принципы классификации семейства *Ostreidae*. — Тр. Львов. геол. о-ва. Палеонт. сер., 1948, вып. 1, с. 3—40. 3. *Stenzel H.* Oysters. — In: Treatise on Invertebrate Paleontology, part N, v. 3. Mollusca 6. Bivalvia. The Geolog. Soc. of America and the University of Kansas. Lawrence, 1971, p. 953—1223. 4. *Vialov O. S.* Sur la classefication des ostréités et leur valeur stratigraphique. — Comptes rendus du Congrés Internat. de Zoologie, 12me sess, Lisbon, 1935, sec. 8, 1937, v. 3, p. 1627—1639. 5. *Вялов О. С.* Загальна класифікація устриць. — ДАН СССР. Сер. Б, 1983, № 11, с. 6—8.

O. S. VIALOV

CLASSIFICATION OF OYSTERS

Summary

In 1936 the author published the scheme of classification of oystres subdevided into four subfamilies: *Ostreinae* Lam., *Gryphaeinae* Vialov, *Lophinae* Vialov and Exogyrinae Vialov with a series of superspecific taxons. The scheme which had been supplemented a little and the principles of classification were published in 1948. Taking into account the tendency to rising of taxons' ranks and transferring of the family of Ostreidae into superfamily and even into suborder, and also after new data had been analysed after 1948, the author made up the suggested classification. The author doesn't agree to the principles of classification by H. B. Stenzel.

Статья поступила в редколлегию 15.02.83